

Dr. Martín H. Devoto



El Dr. Martín H. Devoto completó su Residencia de Oftalmología y revalidó su título de Médico en Estados Unidos. En la *Universidad de Cincinnati*, Ohio, se especializó exclusivamente en las técnicas más modernas de cirugía plástica de los párpados, la frente, las vías lagrimales y la órbita.

Actualmente limita su práctica médica únicamente al tratamiento de estas enfermedades.

Publicó numerosos trabajos científicos en el país y en el exterior, y es autor de capítulos en libros de la especialidad. Ha sido invitado a más de 100 conferencias en el país y en el exterior, entre ellas al congreso de la *American Academy of Ophthalmology*

Docente en la *Universidad del Salvador*. Es el primer miembro de Sudamérica de la *American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery*, entidad que nuclea a los especialistas en estos temas.

La información aquí detallada es de carácter informativo y general, no debiendo interpretarse como un diagnóstico personal.

Dr. Martín H. Devoto

Cirugía de Párpados,
Vías Lagrimales y Orbita.
Cirugía Estética de la Mirada.

Montevideo 1410, C1018ACF Bs. As., Argentina.
Tel. +54 11 4815 5356 Fax +54 11 4814 4043
Cel. +549 11 3180 4455 info@martindevoto.com
www.martindevoto.com



CONSULTORES
Oftalmológicos

Ptosis congénita o adquirida

Párpados caídos



Dr. Martín H. Devoto

Cirugía de Párpados,
Vías Lagrimales y Orbita.
Cirugía Estética de la Mirada.



CONSULTORES
Oftalmológicos

Ptosis congénita o adquirida

Párpados caídos



La ptosis, párpados caídos, ocurre cuando el párpado superior no se eleva adecuadamente.

La ptosis presente desde el nacimiento se denomina **ptosis congénita**.

Es un problema que puede afectar a uno o ambos ojos. La ptosis puede ser leve, en cuyo caso el párpado ocluye parcialmente la pupila, o puede ser severa, ocluyéndola en forma completa.

Los niños con ptosis pueden tener que inclinar la cabeza hacia atrás o levantar en forma exagerada sus cejas para poder ver por debajo de los párpados.

Más información disponible online en www.martindevoto.com

Ptosis adquirida

Causas

La mayoría de las veces, los párpados caen por un estiramiento del tendón que los une al músculo que los levanta. Como típicamente el músculo conserva su fuerza normal, la corrección quirúrgica de un párpado que anteriormente era normal, se basa en reparar el tendón estirado. No es infrecuente que la persona desarrolle este problema después de una cirugía de cataratas. La cirugía de cataratas es en general “la última gota” que hace que un tendón débil finalmente se estire. Otras personas tienen ptosis al cabo de muchos años de utilizar lentes de contacto rígidas, o luego de un traumatismo.

Tratamiento

La cirugía de Ptosis adquirida se realiza con anestesia local en forma ambulatoria. En ocasiones se puede efectuar en el mismo acto quirúrgico una blefaroplastia o cirugía estética de párpados.



Ptosis congénita

Causas

La causa más común de ptosis congénita es un desarrollo incompleto del músculo elevador del párpado. Este músculo es el principal responsable de levantar el párpado.

Los niños con ptosis congénita pueden también tener ambliopía (falta de desarrollo de la visión), estrabismo ojos desviados) o visión borrosa por astigmatismo. Además, los párpados caídos dan una expresión facial no deseable.

Tratamiento

La ptosis congénita se trata con cirugía. El tipo de operación necesaria va a depender del grado de ptosis y de la fuerza del músculo elevador. Si la ptosis no es severa, en general se prefiere operar antes de que el niño comience el colegio primario. Sin embargo, si la ptosis interfiere con la visión, la cirugía se deberá realizar tempranamente, para permitir un desarrollo visual normal.

