

Dr. Martín H. Devoto



El Dr. Martín H. Devoto completó su Residencia de Oftalmología y revalidó su título de Médico en Estados Unidos. En la *Universidad de Cincinnati*, Ohio, se especializó exclusivamente en las técnicas más modernas de cirugía plástica de los párpados, la frente, las vías lagrimales y la órbita.

Actualmente limita su práctica médica únicamente al tratamiento de estas enfermedades.

Publicó numerosos trabajos científicos en el país y en el exterior, y es autor de capítulos en libros de la especialidad. Ha sido invitado a más de 100 conferencias en el país y en el exterior, entre ellas al congreso de la *American Academy of Ophthalmology*

Docente en la *Universidad del Salvador*. Es el primer miembro de Sudamérica de la *American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery*, entidad que nuclea a los especialistas en estos temas.

La información aquí detallada es de carácter informativo y general, no debiendo interpretarse como un diagnóstico personal.

Dr. Martín H. Devoto

Cirugía de Párpados,
Vías Lagrimales y Orbita.
Cirugía Estética de la Mirada.

Montevideo 1410, C1018ACF Bs. As., Argentina.
Tel. +54 11 4815 5356 Fax +54 11 4814 4043
Cel. +549 11 3180 4455 info@martindevoto.com
www.martindevoto.com



CONSULTORES
Oftalmológicos

Cirugía estética de párpados y cejas



Dr. Martín H. Devoto

Cirugía de Párpados,
Vías Lagrimales y Orbita.
Cirugía Estética de la Mirada.



CONSULTORES
Oftalmológicos

Cirugía estética de párpados y cejas

Cuando y porque

Desafortunadamente, con el paso del tiempo, tanto los párpados superiores como los inferiores pueden desarrollar “bolsas” debido a que la piel se estira, los músculos se debilitan y el tejido adiposo que rodea al globo ocular se vuelve mas evidente. Esto ocurre en forma hereditaria y por el paso del tiempo. Las cejas pueden aflojarse y “caer” como consecuencia del mismo proceso.

Estéticamente, estos problemas pueden quitar el atractivo general de los ojos y producir una apariencia de cansancio o de mayor edad. Cuando son severos, pueden disminuir el campo de la visión, y en estos casos la cirugía ya no se considera estética sino funcional. El oftalmólogo especialista en **cirugía de párpados** tiene un entrenamiento específico en este tema, que permite realizar una mejora en el aspecto estético cuidando especialmente la salud de los ojos.

Forma y función

Es frecuente ver pacientes operados de cirugía estética que han cambiado en forma exagerada el aspecto de su rostro. Algunos tienen alteraciones indeseables como descenso de los párpados inferiores que deja ver blanco debajo del ojo, redondeamiento del ángulo externo y en ocasiones, dificultades para cerrar los ojos en forma adecuada con problemas en la córnea. Esto es muy importante en personas que presentan ojos secos y utilizan lágrimas, ya que un exceso de cirugía podría empeorar su condición. Es muy importante realizar las cirugías de párpados mejorando la estética pero sin alterar la función. Los médicos oftalmólogos con formación en cirugía de párpados están especialmente capacitados para cuidar el funcionamiento ocular.

Ultimas técnicas

La cirugía estética de los párpados se denomina “blefaroplastia”. El objetivo es reducir el exceso de tejidos. Puede incluir la piel, músculo y la grasa que rodea el ojo. Las incisiones se realizan en el pliegue del párpado superior. El párpado inferior puede operarse por su lado interno, de esta manera, una vez completado el proceso de cicatrización, las incisiones son invisibles.

Más información disponible online en www.martindevoto.com

La cirugía se realiza con anestesia local y la ayuda de un sedante intravenoso, que elimina cualquier tipo de molestia durante la operación.

En caso en que las cejas estén “caídas” puede realizarse un lifting endoscópico a través de 5 incisiones de 2 cm ocultas en el pelo. Esto permite una recuperación más rápida.

En muchos casos de pérdida de grasa en la cara, puede usarse grasa propia para reponer el volumen perdido y revitalizar la piel.



Blefaroplastia de párpados superiores, donde se removió el exceso de piel



Blefaroplastia transconjuntival de párpados inferiores. La grasa no se quitó, sino que se utilizó para rellenar el surco.